理论力学

Lecture 3. 守恒与对称

傅林

Central South University
物理学院

2025.2

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理
- 5 习题课

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理
- 5 习题课

定义

牛顿力学在处理问题时,经常需要用到各种**守恒律**,如能量守恒、动量守恒、角动量守恒等.分析力学能得到这些守恒律吗?

运动积分

运动积分 (integrals of motion), 亦称首次积分或运动常数, 是由 $q_\alpha, \dot{q}_\alpha$ 组成的函数

$$C = C(q_\alpha, \dot{q}_\alpha)$$

其值只取决于初始条件, 而在**运动的过程中保持不变**.

例如对于一维谐振子, 其能量

$$E = E(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

是一个运动积分, 但 x 和 $\dot{x}$ 都是随时间而变的.

独立运动积分的数目

虽然运动积分为我们分析问题带来了极大的好处，但不是所有运动积分都是有意义的，比方说任意两个运动积分相加依然是运动积分。我们自然想知道：一个体系最多能得到多少个独立的运动积分？

定理

对自由度为 s 的封闭系统，独立的运动积分的数目为 $2s - 1$ 个。

证明 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

是 s 个二阶微分方程，需要 $2s$ 个积分常数（初始条件）

$$C_1, C_2, \dots, C_{2s}$$

才能唯一确定一组解。

记得到的解为：

$$q_\alpha = q_\alpha (C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t), \alpha = 1, 2, \dots, s$$

$$\dot{q}_\alpha = \dot{q}_\alpha (C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t), \alpha = 1, 2, \dots, s$$

上式可视为映射：

$$2s + 1 \text{ 个参数 } \{C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t\} \longrightarrow 2s \text{ 个变量 } \{q_\alpha, \dot{q}_\alpha\}$$

接下来消去时间参数 t . 比方说从第一个广义坐标

$$q_1 = q_1 (C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t)$$

中解出 t :

$$t = t(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})$$

代入剩下的 $2s - 1$ 个变量:

$$q_2 = q_2(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})) \equiv q_2(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})$$

$$\vdots$$

$$q_s = q_s(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})) \equiv q_s(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})$$

$$\dot{q}_1 = \dot{q}_1(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})) \equiv \dot{q}_1(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})$$

$$\vdots$$

$$\dot{q}_s = \dot{q}_s(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})) \equiv \dot{q}_s(q_1; C_1, C_2, \dots, C_{2s})$$

下面的任务, 是将这些积分常数 $C_1, C_2, \dots, C_{2s}$ 用 $q_\alpha, \dot{q}_\alpha$ 表示 (运动积分). 但是有 $2s$ 个积分常数, 上面却只有 $2s - 1$ 个方程, 因此必然有一个不能求出. 令其为 C_{2s} , 则可求得

$$C_i = C_i(q_\alpha, \dot{q}_\alpha; C_{2s}), \quad i = 1, 2, \dots, 2s - 1$$

这便是我们想要的 $2s - 1$ 个运动积分. 妙处在于, 虽然 $q_\alpha, \dot{q}_\alpha$ 都随时间变化, 但是它们组合出来的这 $2s - 1$ 个函数 C_i 却在运动过程中保持不变, 其数值由初始条件决定.

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒**
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理
- 5 习题课

循环坐标

若拉氏量 L 中不显含某广义坐标 q_α , 则将其称为**循环坐标**. 此时显然有 $\partial L / \partial q_\alpha = 0$, 由 Euler-Lagrange 方程得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = 0 \longrightarrow p_\alpha \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \text{const}$$

将 p_α 称为 q_α 对应的**广义动量**. 也就是说:

循环坐标对应的广义动量守恒.

推导熟悉的守恒律

以重力场中的粒子为例, 其拉氏量为

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

可知 x 和 y 为循环坐标, 因此

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = \text{const}$$
$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} = \text{const}$$

这便是动量守恒定律.

以中心势场中的粒子为例, 其拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$$

可知 θ 为循环坐标, 因此

$$p_{\theta} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = \text{const}$$

这便是角动量守恒定律.

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理
- 5 习题课

能量函数

将拉氏量 $L = L(t, q_\alpha, \dot{q}_\alpha)$ 对时间求导：

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \ddot{q}_{\alpha} \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \ddot{q}_{\alpha} \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} \right)\end{aligned}$$

可得

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - L \right) = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

定义能量函数

$$h \equiv \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - L$$

则有

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

也就是说

若拉氏量 L 不显含时间, 则能量函数守恒.

能量函数的意义

下面的任务,是进一步探究能量函数的物理意义. 首先将拉氏量写成 $L = T - V$:

$$h = \sum_{\alpha} \frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - T + V = \sum_{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - T + V$$

然后将动能利用广义坐标表示. 对于 N 个质点组成的系统, 设质点的位置矢为 $\mathbf{r}_i (i = 1, 2, \dots, N)$, 其应为广义坐标和时间的函数:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_s; t)$$

将其对时间求导:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha}$$

这样一来，体系的动能可表示为：

$$\begin{aligned}
 T &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i \\
 &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \right) \\
 &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} + \sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \\
 &\quad + \sum_i \frac{1}{2} m_i \sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \cdot \sum_{\beta=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta
 \end{aligned}$$

上式分别出现了广义速度的零次、一次和二次齐次函数，记作 T_0, T_1, T_2 。

齐次函数的 Euler 定理

若 $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 k 次齐次函数, 则

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} x_i = kf$$

利用 Euler 定理, 可得

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} &= \sum_{\alpha} \frac{\partial T_0}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial T_1}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} \\ &= 0 \cdot T_0 + 1 \cdot T_1 + 2 \cdot T_2 \\ &= T_1 + 2T_2 \end{aligned}$$

将其代入能量函数, 得

$$h = T_1 + 2T_2 - (T_0 + T_1 + T_2) + V = T_2 - T_0 + V$$

如果 r_i 中不显含 t , 则 $T_0 = T_1 = 0$, 此时系统动能 $T = T_2$, 能量函数变为

$$h = T_2 + V = T + V = E$$

这便是系统的总能量.

因此, 能量函数 h 不一定是系统的总能量, 只有当 r_i 中不显含 t (**定常约束系统**) 才是.

哈密顿量

如果我们将能量函数中的 $\partial L / \partial \dot{q}_\alpha$ 换成广义动量 p_α , 则得到

$$H = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} - L = H(q_{\alpha}, p_{\alpha}, t)$$

它称为**哈密顿量**(Hamiltonian). 正如拉氏量 L 是拉格朗日力学的核心, 哈密顿量 H 是哈密顿力学的核心.

能量函数 h 和哈密顿量 H 本质上是一个东西, 之所以用不同符号表示, 是为了区分其函数依赖关系. h 是广义坐标和广义速度 (**速度相空间**) 的函数, 而 H 则是广义坐标和广义动量 (**相空间**) 的函数.

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理**
- 5 习题课

连续对称性

在数学和物理中，一般把对称性定义为**某种变换下的不变性**。

- 将正方形绕其中心旋转一定角度，只有当变换参数(转角)取一些离散值，如 90° , 180° , 270° 等，正方形才能保持不变。
- 而对于一个圆，绕圆心旋转任意角度，这个圆都保持不变，也就是此时**变换参数可以连续取值**，将这种性质称为**连续对称性**。

数学中描述对称性的工具为**群论**；特别地，描述连续对称性的理论称为**Lie 理论**(Lie 群、Lie 代数)。

某对象在一些变换下保持不变，所有的这些变换组成的集合叫做**对称群**。群论在物理学中有着不可替代的作用，如经典力学离不开伽利略群的表示，相对论离不开庞加莱群和洛伦兹群的表示，标准模型中的相互作用牵涉 $SU(n)$ 等。

对称性和守恒律的对应

在物理学中, 对称性和守恒律是一一对应的.

- **空间平移对称对应动量守恒**: 如果作用量在空间平移下保持不变, 动量就守恒.
- **时间平移对称对应能量守恒**: 如果作用量在时间平移下保持不变, 则能量守恒.
- **旋转对称对应角动量守恒**: 如果作用量在旋转变换下保持不变, 则角动量守恒.

证明 首先是时间平移对称. 此时拉氏量将不显含时间, 我们已经知道这会导出能量函数守恒. 在一定条件下, 能量函数就等于系统的总能量, 因此便有能量守恒.

然后证明空间平移对称. 为了简单且不失一般性, 考虑一个二维的平移. 令系统发生下面的平移:

$$x' = x + \delta x, \quad y' = y + \delta y$$

其中 $\delta x, \delta y$ 是与时间无关的小量, 则

$$\dot{x}' = \dot{x}, \quad \dot{y}' = \dot{y}$$

系统的拉氏量也将随着平移变为:

$$L(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t) \rightarrow L'(x + \delta x, y + \delta y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t)$$

将 L' 进行一阶 Taylor 展开:

$$L' = L + \frac{\partial L}{\partial x} \delta x + \frac{\partial L}{\partial y} \delta y + O(\delta x^2) + O(\delta y^2)$$

空间平移对称意味着 $L' = L$, 则

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \frac{\partial L}{\partial y} = 0$$

也就是说 x 和 y 都是循环坐标, 得到其对应的广义动量守恒, 即

$$p_x = m\dot{x} = \text{const}, p_y = m\dot{y} = \text{const}$$

最后证明旋转对称. 依然考虑二维平面上的旋转, 令系统绕 z 轴旋转一个小角度 $\delta\theta$, 则坐标变换为:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \delta\theta & -\sin \delta\theta \\ \sin \delta\theta & \cos \delta\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

即

$$x' = x \cos \delta\theta - y \sin \delta\theta \approx x - y\delta\theta$$

$$y' = x \sin \delta\theta + y \cos \delta\theta \approx y + x\delta\theta$$

系统的拉氏量 L 变为:

$$L'(x - y\delta\theta, y + x\delta\theta, z, \dot{x} - \dot{y}\delta\theta, \dot{y} + \dot{x}\delta\theta, \dot{z}, t)$$

将其进行一阶 Taylor 展开:

$$\begin{aligned}
 L' &= L + \frac{\partial L}{\partial x} (-y\delta\theta) + \frac{\partial L}{\partial y} (x\delta\theta) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} (-\dot{y}\delta\theta) + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} (\dot{x}\delta\theta) + O(\delta\theta^2) \\
 &= L + \left[\left(x \frac{\partial L}{\partial y} - y \frac{\partial L}{\partial x} \right) + \left(\dot{x} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \dot{y} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \right] \delta\theta + O(\delta\theta^2) \\
 &= L + \left\{ \left[x \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - y \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \right] + \left(\dot{x} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \dot{y} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \right\} \delta\theta + O(\delta\theta^2) \\
 &= L + \delta\theta \cdot \frac{d}{dt} \left(x \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - y \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) + O(\delta\theta^2) \\
 &= L + \delta\theta \cdot \frac{d}{dt} (xp_y - yp_x) + O(\delta\theta^2)
 \end{aligned}$$

再利用角动量的定义：

$$\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \longrightarrow J_z = xp_y - yp_x$$

因此

$$L' = L + \delta\theta \cdot \frac{dJ_z}{dt} + O(\delta\theta^2)$$

旋转对称性要求 $L' = L$ ，因此

$$\frac{dJ_z}{dt} = 0 \longrightarrow J_z = \text{const}$$

Noether 定理

Noether 定理将对称性与守恒律之间的关系，总结成了一句极其简洁而优美的话：

对于每一种连续对称性，必然存在相应的守恒量。

连续对称变换

对某一广义坐标 q_α 作如下变换：

$$q_\alpha(t) \longrightarrow Q_\alpha(s, t) \quad s \in \mathbb{R}$$

其中 s 为变换参数，应有 $Q_\alpha(0, t) = q_\alpha(t)$ 。如果这个变换能让拉氏量满足：

$$\frac{\partial}{\partial s} L(t, Q_\alpha, \dot{Q}_\alpha) = 0$$

就称这个变换是连续对称的。

证明 将变换后的 L 对 s 求偏导:

$$\frac{\partial L}{\partial s} = \frac{\partial L}{\partial Q_\alpha} \frac{\partial Q_\alpha}{\partial s} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_\alpha} \frac{\partial \dot{Q}_\alpha}{\partial s}$$

然后取 $s = 0$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial L}{\partial s} \right|_{s=0} &= \left. \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \frac{\partial Q_\alpha}{\partial s} \right|_{s=0} + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \frac{\partial \dot{Q}_\alpha}{\partial s} \right|_{s=0} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) \frac{\partial Q_\alpha}{\partial s} \right|_{s=0} + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \frac{\partial \dot{Q}_\alpha}{\partial s} \right|_{s=0} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \frac{\partial Q_\alpha}{\partial s} \right) \right|_{s=0} = 0 \end{aligned}$$

这样便得到了该连续对称性对应的守恒量.

目录

- 1 运动积分
- 2 广义动量守恒
- 3 广义能量守恒
- 4 Noether 定理
- 5 习题课

例题 1

在下列场中运动时, 动量 $\mathbf{p}$ 和角动量 $\mathbf{J}$ 的哪些分量守恒? (a) 无限大均匀平面场; (b) 无限长均匀圆柱场; (c) 无限长均匀棱柱场; (d) 两个点场; (e) 无限大均匀半平面场; (f) 均匀圆锥场; (g) 均匀圆环场; (h) 无限长均匀圆柱形螺旋线场.

例题 2

质量为 m_2 的平面摆，其悬挂点（质量为 m_1 ）可以沿着水平直线运动。写出该体系的运动积分。